

Espèce invasive - classée nuisible

Le Ragondin

23 avril 2018 par : Pascal ISTVANCIN



Le Ragondin Nom scientifique : *Myocastor coypus*

Description : Espèce de mammifères de la famille des Myocastoridae, la seule espèce actuelle du genre Myocastor. Ce gros rongeur, originaire d'Amérique du Sud, est introduit en Asie, Afrique orientale, Amérique du Nord, Europe au XIX^{ème} siècle pour l'exploitation de sa fourrure bon marché. Tous les individus présents dans ces régions proviennent à l'origine d'évasions ou de lâchers volontaires. Poids moyen : 5–9 kg en moyenne 7 kg. Taille : un corps de 40–60 cm et une queue de 25 à 45 cm. Le ragondin est reconnaissable à ses quatre grandes incisives orange, comme chez les castors, mais tirant plus sur le rouge.

Evolution : De mœurs à tendance crépusculaire et nocturne, il peut avoir une activité diurne non négligeable. Le froid est un facteur limitant et les hivers rigoureux leur sont fatals. L'organisme du ragondin n'est pas adapté au gel comme celui du castor. Lors d'hivers rigoureux, de nombreux ragondins ont la queue qui gèle, ce qui dégénère en gangrène mortelle. Dans son habitat naturel, le ragondin atteint sa maturité sexuelle vers six mois, mais est mature dès deux à quatre mois en captivité. Les mâles sont actifs sexuellement toute l'année. La femelle a deux ou trois portées par an de cinq ou sept petits en moyenne. Elle les allaite pendant sept à huit semaines. Fait particulier, ses mamelles sont déportées vers les flancs au lieu d'être placées sous le ventre comme chez la plupart des mammifères, ce qui lui permet de nager avec ses petits accrochés aux tétines.

Habitat : Il creuse un terrier de 6 à 7 m le long des berges. Ce terrier possède en général plusieurs entrées, dont une subaquatique.

Alimentation : Rongeur herbivore, son régime est normalement constitué de céréales, de racines, d'herbes, de glands ou autres. Néanmoins, il s'adapte très vite aux ressources disponibles sur son territoire. Il consomme ainsi une grande quantité de Poacées, notamment des céréales comme le maïs et le blé. Majoritairement herbivore, il peut toutefois manger des moules d'eau douce.

Espèce invasive Cette espèce invasive est classée nuisibles en France.

« **Confusion possible** » : Il ne faut pas le confondre avec le rat Musqué (*Ondatra zibethicus*), ni avec le rat d'eau (*Sturnulot*), espèce indigène à l'Ancien monde.

Comment différencier le Rat Musqué du Ragondin ?

Le ragondin est plus imposant (60cm sans la queue). Sa tête est importante par rapport au corps. La tache blanche partant du museau s'arrête avant l'œil, les oreilles sont quasiment glabres. Lorsqu'il nage, sa queue est presque toujours sous l'eau. Celle-ci a une section circulaire, alors que celle du rat musqué est ovale. Son pelage est gris brun sombre.

Ses dents, de couleur orange caractéristique, sont toujours apparentes.

Le rat musqué, quant à lui, possède une plus petite tête par rapport au corps, des oreilles plus visibles et poilues, une tache blanche qui va du museau jusque derrière les yeux, et une queue qui reste visible pendant la nage; son pelage va vers le brun roux.

La présence du ragondin se fait souvent au détriment du rat musqué, bien que le rat musqué est plus invasif (peut-être du au fait que le ragondin supporte plus difficilement les périodes de froid).